

ELTE III.Fizika BSC
2014/2015 I.félév
Kondenzált anyag fizika
 11. GYAKORLAT
 (2014. November 25.)

Állapotsűrűségek

Elektronok

Diszperziós reláció:
/skalár/

Állapotsűrűség:
/dN=D(E) dE/

$$E = (\hbar^2/2m^*) k^2$$

$$D(E) = \partial N / \partial E$$

Integrálisan:

$$N(E) = \int_0^E D(E') F(E') dE' = \int_0^E D(E') dE'$$


F(E) : Fermi-Dirac eloszlásfüggvény, /θ függv. /

$$D(E) = V/(2\pi)^3 [4\pi k^2] / \{\partial E / \partial k\} = V/(2\pi^2) [k^2] / \{(\hbar^2/2m^*) 2k\}$$


$$D(E) \sim k$$

$$D(E) \sim \sqrt{E}$$

(nem csak a diszperziós reláció, de az állapotsűrűség is parabolikus /fektetett parabola/)



Diszperziós reláció



Állapotsűrűség

$$N(k) \sim k^3 = N(E) \sim (\sqrt{E})^3 \Rightarrow D(E) \sim (\sqrt{E})$$

$$N_{\text{össz}} = N(E_F) = \int_0^{E_F} D(E') dE'$$


$$N = 2 \underset{\text{spin}}{[V/(2\pi)^3]} (4\pi/3) k_F^3 \Rightarrow k_F = \sqrt[3]{3\pi^2 N/V}$$

$$E_F = (\hbar^2/2m^*) k_F^2$$

Átlagenergia

$$\bar{E} = \frac{1}{N} \int_0^{E_F} E dN = \frac{1}{N} \int_0^{E_F} E D(E) dE$$

$$N(E) = \alpha E^{3/2} ; D(E) = 3/2 \alpha E^{1/2}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{N} \int_0^{E_F} E D(E) dE = \frac{1}{N} \int_0^{E_F} E (3/2) \alpha \sqrt{E} dE = \\ &= \frac{1}{N} (3/2) \alpha \int_0^{E_F} E^{3/2} dE = \frac{1}{N} (3/2) \alpha \frac{E_F^{5/2}}{5/2} = \frac{3}{5} E_F \end{aligned}$$